**DERRAME PLEURAL COM CONTEÚDO DE NUTRIÇÃO
PARENTERAL COMO COMPLICAÇÃO DA INSERÇÃO DE
CATETER VENOSO CENTRAL EM RECÉM-NASCIDO: UM
RELATO DE CASO**

Nº 4DNB

Introdução

O extravasamento de Nutrição Parenteral Total (NPT) para o espaço pleural tem sido documentado em relatos de caso. Embora essa seja uma complicação relativamente rara, está relacionada a mal prognóstico para o paciente.

Objetivo do Estudo

O extravasamento de Nutrição Parenteral Total (NPT) para o espaço pleural tem sido documentado em relatos de caso. Embora essa seja uma complicação relativamente rara, está relacionada a mal prognóstico para o paciente. Objetivo: Descrever o caso de um recém-nascido que, após inserção de cateter central, evoluiu com derrame pleural compatível com NPT.

Relato do caso

Recém-nascido prematuro (32 semanas), com dextrocardia, submetido a correção de Hérnia Diafrágica à esquerda e drenagem do hemitórax esquerdo no 2º dia de vida. No 25º dia de vida foi necessário trocar o cateter central (a ponta havia ficado em veia braquiocefálica esquerda) e o novo foi inserido na Veia Axilar direita por dissecação. A radiografia mostrou a ponta fazendo um ângulo próximo de 90º com a parede da Veia Cava Superior (VCS). Após essa punção foi iniciada a NPT e progressão diária do volume foi de 190ml, 283ml, 287ml, 408ml, simultaneamente o paciente evoluía com piora ventilatória, coincidindo o pior momento com o dia de maior volume de NPT. Foi diagnosticado um derrame pleural 5 dias após a inserção do cateter, dessa vez à direita. O paciente foi submetido a uma toracocentese diagnóstica, tendo um resultado compatível com NPT. O cateter da veia axilar foi retirado e puncionado um PICC (*Peripherally Inserted Central Catheter*) no braço esquerdo, com a ponta impactando em veia braquiocefálica esquerda.

Discussão

Nesse caso, houve uma piora clínica importante no 4º dia de uso da NPT, estando o cateter com ponta direcionada para a parede lateral da VCS. Outros relatos de caso na literatura também demonstraram correlação entre NPT e complicações de extravasamento com cateteres mal posicionados. O paciente tinha uma grande hérnia diafrágica e uma dextrocardia que contribuíram para a dificuldade de posicionamento da ponta do cateter na junção cavo-atrial.

Conclusões

É necessária alta suspeição clínica para o diagnóstico de complicações relacionadas aos cateteres venosos centrais em recém-nascidos e deve-se estar atento ao correto posicionamento da ponta, notadamente quando forem usadas soluções de alta osmolaridade e por tempo prolongado.

Referências

- BATIHAN G, CEYLAN KC, KAYA SO Rare complication of central venous catheter placement: bilateral hydrothorax BMJ Case Reports CP 2018;11:e226699.
- PITTIRUTI M, HAMILTON H, BIFFI R. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Central Venous Catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). Clinical Nutrition 2009; 28:365-377.

Legenda:

Fig 1. Radiografia (RX) tóraco-abdominal com Hérnia Diafrágica.

Fig 2. RX do tórax com CCIC mal posicionado.

Fig 3. RX do tórax com CCIC mal posicionado e derrame pleural direito.

Fig 4. RX do tórax com CCIC mal posicionado e hemitórax direito drenado.

Introdução

O extravasamento de Nutrição Parenteral Total (NPT) para o espaço pleural tem sido documentado em relatos de caso. Embora essa seja uma complicação relativamente rara, está relacionada a mal prognóstico para o paciente.

Objetivo do Estudo

O extravasamento de Nutrição Parenteral Total (NPT) para o espaço pleural tem sido documentado em relatos de caso. Embora essa seja uma complicação relativamente rara, está relacionada a mal prognóstico para o paciente. Objetivo: Descrever o caso de um recém-nascido que, após inserção de cateter central, evoluiu com derrame pleural compatível com NPT.

Relato do caso

Recém-nascido prematuro (32 semanas), com dextrocardia, submetido a correção de Hérnia Diafragmática à esquerda e drenagem do hemitórax esquerdo no 2º dia de vida. No 25º dia de vida foi necessário trocar o cateter central (a ponta havia ficado em veia braquiocefálica esquerda) e o novo foi inserido na Veia Axilar direita por dissecção. A radiografia mostrou a ponta fazendo um ângulo próximo de 90º com a parede da Veia Cava Superior (VCS). Após essa punção foi iniciada a NPT e progressão diária do volume foi de 190ml, 283ml, 287ml, 408ml, simultaneamente o paciente evoluía com piora ventilatória, coincidindo o pior momento com o dia de maior volume de NPT. Foi diagnosticado um derrame pleural 5 dias após a inserção do cateter, dessa vez à direita. O paciente foi submetido a uma toracocentese diagnóstica, tendo um resultado compatível com NPT. O cateter da veia axilar foi retirado e puncionado um PICC (*Peripherally Inserted Central Catheter*) no braço esquerdo, com a ponta impactando em veia braquiocefálica esquerda.

Figura 1. Radiografia (RX) tóraco-abdominal com Hérnia Diafragmática.

Discussão

Nesse caso, houve uma piora clínica importante no 4º dia de uso da NPT, estando o cateter com ponta direcionada para a parede lateral da VCS. Outros relatos de caso na literatura também demonstraram correlação entre NPT e complicações de extravasamento com cateteres mal posicionados. O paciente tinha uma grande hérnia diafragmática e uma dextrocardia que contribuíram para a dificuldade de posicionamento da ponta do cateter na junção cavo-atrial.

Conclusões

É necessária alta suspeição clínica para o diagnóstico de complicações relacionadas aos cateteres venosos centrais em recém-nascidos e deve-se estar atento ao correto posicionamento da ponta, notadamente quando forem usadas soluções de alta osmolaridade e por tempo prolongado.

Referências

1. FLANNIGAN C, BOURKE T, KEOWN K, TERRIS M. Bilateral total parenteral nutrition pleural effusions in a 5-week-old male infant. *BMJ Case Rep.* 2012 Jul 3;2012.
2. BATIHAN G, CEYLAN KC, KAYA SO Rare complication of central venous catheter placement: bilateral hydrothorax *BMJ Case Reports CP* 2018;11:e226699.
3. PITTIRUTI M, HAMILTON H, BIFFI R. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Central Venous Catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). *Clinical Nutrition* 2009; 28:365-377.

Legenda:

Fig 2. RX do tórax com CCIC mal posicionado em detalhe. Ponta em ângulo próximo de 90º com a parede da Veia Cava Superior.

Fig 3. RX do tórax com CCIC mal posicionado e derrame pleural direito.

Fig 4. RX do tórax com CCIC mal posicionado e hemitórax direito drenado.